

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Nasivin[®] 0,025%

Nosní kapky, roztok



Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MERCK KGaA, 64271 Darmstadt, SRN

Složení

Oxymetazolin hydrochloridum 0,025 g ve 100 ml vodného roztoku.

Pomocné látky: dihydrát edetanu disodného, benzalkonium chlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný, čišťená voda.

Indikační skupina:

Otorhinolaryngologica.

Charakteristika:

Přípravek snižuje překrvení a otok sliznice, uvolňuje průchodnost horních cest dýchacích, snižuje bolestivost při zánětu středouší a kataru Eustachovy trubice.

Indikace:

Nasivin 0,025 % se používá při akutní rýmě z nachlazení, vazomotorické a alergické rýmě, zánětu středouší, kataru Eustachovy trubice, zánětu vedlejších nosních dutin. Je určen dětem od 1 roku věku do 8 let.

Kontraindikace:

Při přecitlivělosti na oxymetazolin se přípravek nesmí užívat. Nasivin nosní kapky by neměl být používán při zánětech kůže a sliznice v okolí nosních vchodů s tvorbou strupů (např. suchá rýma - rhinitis sicca).

Nežádoucí účinky:

Občas se může vyskytnout pálení, suchost nosní sliznice, kýchání nebo pocit „ucpaného nosu“. Ojedinelé se mohou vyskytnout zvýšený krevní tlak, zrychlený tep a pocit bušení srdce. Velice zřídka se může objevit nespavost a podrážděnost nebo naopak zvýšená spavost. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí podávání přerušete a poraďte se s lékařem.

Interakce:

Při současném anebo předchozím užívání léků proti depresi (tricyklická antidepresiva) se může zvýšit krevní tlak. Tato interakce se v dětském věku nepředpokládá.

Dávkování:

Neurčí-li lékař jinak, podáváme 1 - 2 kapky 2 - 3 krát denně do každého nosního vchodu.

Způsob použití:

K usnadnění a k zajištění přesného dávkování je Nasivin 0,025 % vybaven dávkovací pipetou.



Upozornění:

Nasivin 0,025 % nesmí být používán u novorozenců a kojenců.

Je-li podáván dítěti jiný lék na předpis, nebo volně prodejný, poraďte se o podávání Nasivinu s lékařem. Bude-li dítěti lékař předepisovat nějaké léky, upozorněte jej, že podáváte dítěti Nasivin.

Nasivin se nemá používat častěji než je doporučeno. Bez lékařského doporučení by neměl být přípravek podáván déle než 1 týden. Dlouhodobé užívání oxymetazolinu může způsobit přechodné poškození nosní sliznice a řasinkového systému, ale může vést až k trvalému poškození sliznice (rhinitis sicca).

Pokud se příznaky nezlepší do 3 dnů nebo se objeví nežádoucí účinky, poraďte se s lékařem.

Dojde-li k vypití přípravku dítětem nebo i dospělým, vyhledejte lékaře.

Uchování:

Při teplotě do 25 °C.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Ukládejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

Kapací lahvička s 10 ml vodného roztoku.

Datum poslední revize:

8. 9. 2004



Nasivin 0,025% - PŘÍBALOVÝ LETÁK (1. str CZ text)

(nová verze 3.kor.)