

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Nasivin[®] 0,05%



Nosní sprej (s odměřeným dávkováním)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MERCK KGaA, 64271 Darmstadt, SRN

Složení

Oxymetazolin hydrochloridum 0,05 g ve 100 ml vodného roztoku.
Pomocné látky: dihydrát edetanu disodného, benzalkonium chlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný, čišťená voda.

Indikační skupina

Otorhinolaryngologica.

Charakteristika

Přípravek snižuje překrvení a otok sliznice, uvolňuje průchodnost horních cest dýchacích, snižuje bolestivost při zánětu středouší a kataru trubice Eustachovy.

Indikace

Nasivin 0,05 % sprej se používá při akutní rýmě, zánětu středouší, kataru trubice Eustachovy, zánětu vedlejších nosních dutin. Je určen dospělým a dětem od 8 let. V těhotenství a v době kojení je možné přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

Kontraindikace

Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na oxymetazolin. Nasivin sprej nesmí být používán u novorozenců, kojenců a předškolních dětí, kde je třeba zvolit jinou lékovou formu. Nasivin sprej by neměl být používán při zánětech kůže a sliznice v okolí nosních vchodů s tvorbou strupů (např. suchá rýma - rhinitis sicca). Pouze na doporučení lékaře mohou přípravek užívat pacienti s koronárním a jiným těžkým srdečním onemocněním, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo onemocněním štítné žlázy.

Nežádoucí účinky

Občas se může vyskytnout pálení, suchost nosní sliznice a kýchání. Ojedinelé, po odeznění účinku, je výraznější pocit „ucpaného nosu“. Zřídka se po užití Nasivinu mohou objevit oběhové příznaky jako bušení srdce, zrychlená akce srdeční a vzestup krevního tlaku. Velice zřídka se může objevit nespavost, podrážděnost nebo naopak zvýšená spavost. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí podávání přerušete a poraďte se s lékařem.

Interakce

Některé látky používané v psychiatrii (tricyklická antidepre-

siva) mohou při současném užívání s Nasivinem způsobit zvýšení krevního tlaku.

Dávkování a způsob použití

Neurčí-li lékař jinak, vstříkujte se 2 - 3krát denně do každého nosního vchodu. Sprej je vybaven mechanickým dávkovačem, který umožňuje přesnou a účinnou aplikaci jednotlivé dávky. Před použitím sejměte modrý kryt. Stlačením kruhové části uzávěru proti lahvičce docílíte vystříknutí spreje. Jedno stlačení odpovídá jednotlivé dávce.



Upozornění

Nasivin 0,05 % sprej nesmí být používán u novorozenců, kojenců a předškolních dětí.

Nemocní s glaukomem, těhotné a kojící ženy by se o užívání Nasivinu měli poradit s lékařem.

Užíváte-li jiné léky na předpis, nebo volně prodejné, poraďte se o užívání Nasivinu s lékařem. Bude-li Vám lékař předepisovat nějaké léky, upozorněte jej, že užíváte Nasivin.

Nasivin se nemá používat častěji než je doporučeno. Bez lékařského doporučení by neměl být přípravek podáván déle než 1 týden. Dlouhodobé užívání oxymetazolinu může způsobit přechodné poškození nosní sliznice a řasinkového systému, ale může vést až k trvalému poškození sliznice (rhinitis sicca).

Pokud se příznaky nezlepší do 1 týdne nebo se objeví nežádoucí účinky, poraďte se s lékařem.

Dojde-li k vypití přípravku dítětem nebo i dospělým, vyhledejte lékaře.

Uchovávání

Při teplotě do 25 °C.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Ukládejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

Sprejová lahvička s mechanickým dávkovačem s obsahem 10 ml.

Datum poslední revize

8. 9. 2004



Nasivin 0,05% SPREJ - PŘÍBALOVÝ LETÁK (1. str CZ text)

(nová verze 3.kor.)